

Назва лікувального закладу
Езофагогастродуоденоскопія № _____

Апарат _____ Дезінфекуючий розчин _____

ПІБ _____ **вік** _____ **ASA** _____

Стравохід вільно прохідний _____

Хіатус на _____ см; палисадні судини – не візуалізуються; стравохідно-шлунковий перехід на _____ см. Z лінія на _____ см. CLE – нема, є – циліндричний сегмент _____ см, язикі до _____ см.

Слизова стравоходу _____

Розетка НСС зникається повністю, частково, не зникається _____

Стан кардіальної складки – _____ ступінь

Зміст шлунку: незначна, помірна, підвищена, значна кількість _____

Слизова шлунку _____

Складки слизової: звичайних розмірів, зглажені, потовщені _____

Перистальтика – відсутня, в'яла, активна, підвищеної активності. **Пілорус** – звичайний, овальний, зіркоподібний, деформований помірно, грубо _____

зникається: повністю, частково, не зникається. **Рефлюкс жовчі:** немає, є. **Цибулина дванадцятипалої кишки:** звичайної форми, деформована помірно, грубо. _____ можливо роздути повітрям вільно, задовільно, важко. _____ прохідна для ендоскопу.

Слизова _____

Постбульбарний відділ _____

Заключення _____

Рекомендовано _____

” _____ 200 _____ р. _____ г. _____ хв. Лікар _____”